

තමකල්පාස රෝගයේදී ඇතිවන තීව්‍ර ශ්වසන අපහසුතාවය මඟහැරීම
 අරඹයා දේශීය ප්‍රතිකාරයක් ලෙස ත්‍රිකපුවාසා වටී සහ ධූප උපක්‍රම
 යෙදීම පිළිබඳ සායනික අධ්‍යයනයක්



කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ දේශීය වෛද්‍ය විද්‍යායතනයේ දර්ශනපති(ආයුර්වේද)
 පත්වන උපාධිය සඳහා ඉදිරිපත් කරනු ලබන නිබන්ධනය

එච්.එල්.එන්. ගුණසේකර

CLASS NO. 612-1
 ACC NO. 51385
 COST 1200

සහාය උපදේශක
 වෛද්‍ය චන්ද්‍රා කරුණාදාස
 ඩී.අයි.එම්.එස්.(ගෞරව) ශ්‍රී ලංකා
 එම්.එස්.ඒ.එම්. ගුණරාජ ඉන්ද්‍රියානු

උපදේශක
 ජ්‍යෙෂ්ඨ කථිකාචාර්ය ආර්.එම්.පී. රංජල
 ඩී.අයි.එම්.එස්. II පෙළ(ගෞරව) ශ්‍රී ලංකා
 එච්.පී.ඒ. ශ්‍රී ලංකා



දේශීය විකිත්සා දෙපාර්තමේන්තුව
 දේශීය වෛද්‍ය විද්‍යායතනය
 කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලය
 ශ්‍රී ලංකාව

2000 නොවැම්බර්

එම්බ්/96/40

සාරාංශය

ප.වවිධ ශ්‍රීවාස අතුරින් තමක ශ්‍රීවාස රෝගයේදී ඇතිවන නිවු ශ්‍රීවාස අපහසුතාවය
සා ක්ෂණිකව ප්‍රතිකාර යෙදීම අත්‍යාවශ්‍ය වේ. මෙම අවස්ථාවේදී රෝගියා බලවත් අම්ලකර
භාවයකට පත්වේ.

මෙම රෝගය සඳහා ආයුර්වේද හා දේහීය ප්‍රතිකාර විවිධාකාරයෙන් දක්වා ඇත. එම
කාර වලින් රෝගය යටපත් කිරීමට හැකියාවක් ඇතත් නිවු ලක්ෂණ ක්ෂණිකව ඇතිවීම මෙම
රෝගයේ විශේෂ ලක්ෂණයක් වේ. මේ සඳහා ක්ෂණිකව ප්‍රතිඵල ගෙනදෙන ඖෂධයන් හඳුනා
නිම කාලීන අවශ්‍යතාවයක් වේ. මෙම අවස්ථාව සඳහා යොදන්නාවූ දූප උපක්‍රම දේහීය
කසාවේ සඳහන් වේ. එවැනි දූපයක් සහ දේහීය වටීයක ඇති ක්‍රියාකාරීත්වය පරීක්ෂා කර
මෙම පර්යේෂණයේ අරමුණ වේ.

රෝගීන් බොරැල්ලේ ආයුර්වේද ශික්ෂණ රෝහලේ බාහිර අංශයෙන් තෝරා ගත් අතර
ර අංශයෙන් හා නෙව්‍රාසිකව ප්‍රතිකාර යොදමින් පරීක්ෂණය කරන ලදී. සතියකට වරක් එම
රීන් පරීක්ෂා කර අවශ්‍ය සටහන් එයට අදාළ පත්‍රිකා වල සටහන් කර ගන්නා ලදී.
ඖයම් තුනකට බෙදා පරීක්ෂණය දියත් කළ අතර මන්ද නිවු ශ්‍රීවාස අපහසුතා ඇති
ථාවේ පවත් දීර්ඝ කාලීනව ත්‍රිකටුවාසා වටීය යෙදු අතර තරමක නිවු අවස්ථාව සඳහා
න් කොටස් දෙකකට බෙදා කොටසකට දූපයක්ඒ සඳහා විශේෂයෙන් සකස් කර ගත් දූප
යක් මගින් භාවිතා කළ අතර එකී දූප ඖෂධයම වාෂ්පස්වේද ආකාරයෙන් කොටසකට
න ලදී. මෙම ඖෂධයන් යෙදීමට පෙර හා පසු පහළ වන ලක්ෂණයන් වෙන වෙනම
ගන්නා ලදී .

හා වාණිජ ස්වේදය යෙදූ රෝගීන් අතරින් ශ්වසන වේගය පහ වීමේ ප්‍රවණතාවයක්
 දැක ගැනීමට හේතු විය. ප්‍රතිඵල සාකච්ඡාවේදී එය සවිස්තරව දක්වා ඇත.
 සාමාන්‍ය සඳහා යොදා ගන්නා ලද සියළුම රෝගීන් මෙයට පෙර තීව්‍ර ශ්වසන අපහසුතාව
 ඇති වීමෙන් පිඩාවට පත්වූ රෝගීන් වූ අතර දීර්ඝ කාලීනව වටීය උපයෝගීත්වයෙන්
 තොරව අවස්ථාවන් ක්‍රමයෙන් මගහැරී ඇත. එසේම තීව්‍ර ශ්වසන අපහසුතා ඇති වීමේ
 හේතු ඇත් වී ඇත. එසේම රෝගීන්ගේ ප්‍ර ශ්වාස ක්‍රියා වේගයන්හිදී වැඩිවීමක් පෙන්වුම්
 පරීක්ෂණයෙන් බලාපොරොත්තු වූයේ තමක ශ්වාස රෝගයේ පවතින තීව්‍ර
 අපහසු තාවය මගහැරීම අරඹයා යෙදිය හැකි දේහීය ඖෂධයන් දෙකක සාඵලය නාවය
 පරීක්ෂණයෙන් ලද ප්‍රතිඵල අනුව එම අරමුණ ඉටු වී ඇති බැව් කිව හැක.

1. වෛ. පී. ජයරත්න, 1967.
 2. වෛ. පී. ජයරත්න - වෛ. පී. ජයරත්න - වෛ. පී. ජයරත්න, 1967.
 3. වෛ. පී. ජයරත්න, 1964.
 4. වෛ. පී. ජයරත්න සහ වෛ. පී. ජයරත්න, 1964.
 5. වෛ. පී. ජයරත්න, වෛ. පී. ජයරත්න, 1964.
 6. වෛ. පී. ජයරත්න, වෛ. පී. ජයරත්න, 1964.
 7. වෛ. පී. ජයරත්න, වෛ. පී. ජයරත්න, 1964.
 8. වෛ. පී. ජයරත්න, වෛ. පී. ජයරත්න, 1964.
 9. වෛ. පී. ජයරත්න, වෛ. පී. ජයරත්න, 1964.
 10. වෛ. පී. ජයරත්න, වෛ. පී. ජයරත්න, 1964.